

ÖGONKLINIKEN UMEÅ
NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
901 85 UMEÅ

Information till dig som ska opereras för stopp i tårkanalen (silikonslangs-operation)



ÖGONKLINIKEN UMEÅ
NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
901 85 UMEÅ

Information till dig som ska opereras för stopp i tårkanalen (silikonslangs-operation)



Behandling

Strax före operationen får man avsvällande droppar och lokalbedövning på pinnar i näsan. Inne på operationssalen får man lokalbedövning över tårsäcken och tårvägarna. Med sonder går man sedan igenom hindret i tårkanalen varefter man trär in en silikon-slang som knyts över ett litet gummirör i näsan.

Efter operationen

Vid behov ges antibiotikadroppar efter operationen. Operationsdagen kan du vara svullen i huden på insidan om ögat. Om du får tilltagande besvär med synnedsättning, rodnad, smetighet eller svullnad i eller runt ögat skall du kontakta ögonkliniken. Det kan tillfälligt finnas lite blod i nässekretet om du snyter dig. Får du en näsblödning efter operationen skall du kontakta ögonkliniken. Vid problem med slangen, t.ex. att den kommer ut som en ögla i ögonvrån, hör du också av dig. Slangen ska sitta i ca 3 månader. Under denna tid är det inte säkert att tårflödet har förbättrats.

Kontaktuppgifter

Frågor inför operation:

Operationsplaneraren på ögonmottagningen i Umeå
Telefon **090-785 91 72**
Måndag–torsdag 13.00–14.30, fredag 10.00–11.30

Frågor efter operation:

Ögonmottagningen i Umeå, telefon **090-785 91 57**
Vardagar: 8–11.30 och 13–14.30
Övriga tider: sjukvårdsrådgivning telefon **11 77**

Behandling

Strax före operationen får man avsvällande droppar och lokalbedövning på pinnar i näsan. Inne på operationssalen får man lokalbedövning över tårsäcken och tårvägarna. Med sonder går man sedan igenom hindret i tårkanalen varefter man trär in en silikon-slang som knyts över ett litet gummirör i näsan.

Efter operationen

Vid behov ges antibiotikadroppar efter operationen. Operationsdagen kan du vara svullen i huden på insidan om ögat. Om du får tilltagande besvär med synnedsättning, rodnad, smetighet eller svullnad i eller runt ögat skall du kontakta ögonkliniken. Det kan tillfälligt finnas lite blod i nässekretet om du snyter dig. Får du en näsblödning efter operationen skall du kontakta ögonkliniken. Vid problem med slangen, t.ex. att den kommer ut som en ögla i ögonvrån, hör du också av dig. Slangen ska sitta i ca 3 månader. Under denna tid är det inte säkert att tårflödet har förbättrats.

Kontaktuppgifter

Frågor inför operation:

Operationsplaneraren på ögonmottagningen i Umeå
Telefon **090-785 91 72**
Måndag–torsdag 13.00–14.30, fredag 10.00–11.30

Frågor efter operation:

Ögonmottagningen i Umeå, telefon **090-785 91 57**
Vardagar: 8–11.30 och 13–14.30
Övriga tider: sjukvårdsrådgivning telefon **11 77**