


Urinvägsinfektion (UVI) hos sköra äldre



* Ursprungsmaterialet är framtaget av ImpresU projektet.

Symtom som kan vara UVI

Patienter utan kateter: uppmärksamma symtom från urinvägarna, allmänna infektionssymtom och andra viktiga symtom.

Patienter med kateter: var särskilt uppmärksam på allmänna infektionssymtom.

Symtom från urinvägarna:

1. Sveda/obehag vid miktion
2. Täta trängningar
3. Frekventa miktationer (kissar ofta)
4. Nyttillkommen inkontinens
5. Synligt var från urinrörsmynningen

Allmänna infektionssymtom:

1. Feber*
2. Frossa/skakningar
3. Delirium

Andra viktiga symtom:

1. Flanksmärta/stötömhet över njurloger
2. Smärta nedtill i buken

*Feber: en örontemp > 37,8° ELLER en rektaltemp >38.1°C ELLER upprepad örontemp >37.2°C ELLER upprepad rektaltemp >37.5 °C. Vid tveksamhet är rektaltemp alltid att föredra.

Ospecifika symtom som (ensamt) inte talar för UVI

Urin

1. Förändrad färg eller lukt på urinen
2. Grumlig urin
3. Makroskopisk hematuri (synligt blod i urinen)

Urogenitala symtom

1. Skrotal smärta (smärta pungen)
2. Prostatasmärta
3. Urinretention
4. Nocturi (nattliga urinträngningar/blåstömning)
5. Minskad urinproduktion
6. Suprapubisk smärta

Andra symtom

1. Allmän sjukdomskänsla
2. Trötthet (ny/förvärrad)
3. Svaghet (ny/förvärrad)
4. Yrsel (ny/förvärrad)
5. Synkope (svimning)
6. Försämrade funktionsförmåga (ADL)
7. Minskad rörlighet

Gastrointestinala symtom

1. Aptitlöshet
2. Nedsatt vätskeintag
3. Illamående (med eller utan kräkning)
4. Diarré

Mentala symtom

1. Är sig inte lik
2. Agitation/ilska (ny/förvärrad)
3. Förändrat mentalt status såsom oro och förvirring (inte delirium)